




Modified Listeria Selective Supplement (Oxford) SR0206E



10 x	Amphotericin B	5.0 mg	Cefotetan	1.0 mg
	Colistin sulphate	10.0 mg	Fosfomycin	5.0 mg
	Acriflavin	2.5 mg		

Precautions: Use sterile techniques at all times. Do not use beyond stated expiry date.
 Precauciones: Manipular asépticamente durante todo el procedimiento. No utilizar una vez caducado.
 Vorsichtsmassnahmen: Nur unter aseptischen Bedingungen arbeiten. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatum verwenden.
 Précaution: Travailler à chaque fois de manière stérile. Ne pas utiliser après la date d'expiration.
 Precauzioni: Operare sempre in condizioni di sterilità. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
 Forholdsregel: Anvend steril teknik til hver en tid. Må ikke anvendes ud over den angivne udløbsdato.
 Försiktighet: Använd alltid sterila tekniker. Använd inte produkterna efter deras utgångsdatum.
 Precauções: Utilizar sempre a técnica estéril. Não utilizar depois de ter caducado o prazo de validade indicado.
 Προφυλάξεις: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε άσηπτη τεχνική. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
 注意: 常に滅菌処理を行ってください。記載されている使用期限を過ぎたものは、絶対に使用しないでください。






Modified Listeria Selective Supplement (Oxford) SR0206E



10 x	Amphotericin B	5.0 mg	Cefotetan	1.0 mg
	Colistin sulphate	10.0 mg	Fosfomycin	5.0 mg
	Acriflavin	2.5 mg		

Precautions: Use sterile techniques at all times. Do not use beyond stated expiry date.
 Precauciones: Manipular asépticamente durante todo el procedimiento. No utilizar una vez caducado.
 Vorsichtsmassnahmen: Nur unter aseptischen Bedingungen arbeiten. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatum verwenden.
 Précaution: Travailler à chaque fois de manière stérile. Ne pas utiliser après la date d'expiration.
 Precauzioni: Operare sempre in condizioni di sterilità. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
 Forholdsregel: Anvend steril teknik til hver en tid. Må ikke anvendes ud over den angivne udløbsdato.
 Försiktighet: Använd alltid sterila tekniker. Använd inte produkterna efter deras utgångsdatum.
 Precauções: Utilizar sempre a técnica estéril. Não utilizar depois de ter caducado o prazo de validade indicado.
 Προφυλάξεις: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε άσηπτη τεχνική. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
 注意: 常に滅菌処理を行ってください。記載されている使用期限を過ぎたものは、絶対に使用しないでください。



Modified Listeria Selective Supplement (Oxford) SR0206E



10 x	Amphotericin B	5.0 mg	Cefotetan	1.0 mg
	Colistin sulphate	10.0 mg	Fosfomicin	5.0 mg
	Acriflavin	2.5 mg		

Danger: This product contains colistin sulphate and fosfomicin. Harmful if swallowed. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Peligro: Este producto contiene sulfato de colistina y fosfomicina. Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Gefahr: Toxisch. Produkt enthält Colistinsulfat und Fosfomicin. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Danger: Ce produit contient du colistine (sulfate) et fosfomicine. Nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Pericolo: Questo prodotto contiene colistina solfato e fosfomicina. Nocivo se ingerito. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare una reazione allergica cutanea. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Fare: Dette produkt indeholder colistinsulfat og fosfomicin. Farlig ved indtagelse. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesøjnebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Fara: Denna produkt innehåller colistinsulfat och fosfomicin. Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INÅNDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Perigo: Este produto contém sulfato de colistina e fosfomicina. Nocivo por ingestão. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Κίνδυνος: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.